

PREPARAZIONE ALL'ESAME

ENTERO TC

Gentile Utente,

Le comunichiamo alcune informazioni in merito all'esame di Entero-TC.

Il 3° e 2° giorno prima dell'esecuzione dell'esame:

- ❖ Dieta priva di scorie (evitare cibi ricchi di fibre, cibi integrali, carne rossa, burro, frutta, cereali, legumi, prodotti con latte intero, ecc.);
- ❖ Corretta idratazione (almeno 2 L di acqua naturale non gassata al giorno), se non controindicato per problemi di sovraccarico di circolo (problemi cardiaci, ecc.).

Il giorno prima all'esame:

- ❖ Colazione: latte, thè e liquidi ben zuccherati;
- ❖ Pranzo: pasta o riso in bianco conditi con olio, pesce;
- ❖ Cena: dieta liquida (thè zuccherato, brodo, ghiaccioli);
- ❖ Eseguire una pulizia intestinale con un farmaco a base di PEG - Polietilenglicole: ad esempio 2 buste di SELGESSE 1000 in 2 L di acqua (250 mL ogni 15 minuti) oppure 4 buste di Macro-P ciascuna in 250 mL di acqua ogni 15 minuti. Si consiglia di non assumere cibi solidi nelle 3 ore prima della somministrazione del SELGESSE o Macro-P.

Il giorno dell'esame:

- ❖ Assumere liberamente i farmaci abituali ad esclusione di ipoglicemizzanti orali, es. metformina, che deve essere sospesa 48 ore prima dell'esame solo nel caso di insufficienza renale.
- ❖ Presentarsi almeno un'ora prima dell'orario dell'appuntamento, a digiuno (astinenza dall'assunzione di cibi solidi dalla mezzanotte);

Un'ora prima dell'esecuzione dell'esame:

- ❖ Verrà somministrata una soluzione a base di PEG – Polietilenglicole – disciolto in 1500 mL di acqua naturale e 500 mL di acqua naturale:
 - 1500 mL soluzione in 30 minuti;
 - 500 mL di acqua naturale prima dell'inizio dell'esame.
- ❖ durante l'esecuzione dell'esame verrà somministrato per via endovenosa un agente antiperistaltico per ridurre la motilità delle anse intestinali (N-butilbromuro di joscina) ed è pertanto indispensabile verificare con il

Medico curante che non ci siano controindicazioni alla sua iniezione (es. nei casi di glaucoma, ipertrofia prostatica, aritmie cardiache).

N.B.: rappresenta controindicazione all'esame l'aver eseguito un tubo digerente completo con pasto baritato meno di una settimana prima o un'endoscopia nelle 48 ore precedenti.